VISCUM Cariophylloides anguſtifolium, Floribus longis tubuloſis cæruleis, ex ſpicis ſquamoſis cæruleis erumpentibus.

The Wild Pine.

THIS Plant riſes from a round tuberous Root, with many Fibres ſpreading on the Surface of the Limbs and Branches of Trees, inſinuating a little Way into the Bark; from the Root grow many concave Leaves, folded in a Manner like thoſe of the *Ananas*, the Outſides are prominent and large below, tapering into narrow graſſy Points, reflected back and hanging down; from the Middle riſes a round ſtreight Stalk, at the Top of which are placed five (more or leſs) red ſcaly Spikes five or ſix Inches long, from the Sides of which ſhoot forth obliquely, ſeveral cylindrical, tubulous, monopetalous blue Flowers, with ſeveral *Stamina*, and a yellow *Stilus*; the Flower conſiſting of one Leaf only, is folded ſpirally in a ſingular Manner. Theſe Plants grow to various Sizes, from one to two Feet and upwards in Height, growing always erect.

But what recommends this uſeful and very ſingular Plant is, that its hollow Leaves lapping over one another, are ſo cloſely placed, that one Plant will contain two Quarts of clear Water. In many Countries between the *Tropicks* that are deſtitute of Water, having neither Springs nor Rivers, theſe Plants abound, and are of great Benefit in relieving the Thirſty in Diſtreſs, as I have often experienced in Draughts of this refreſhing Water, which tho' receiving the Heat of the Sun's perpendicular Rays, was always as cool as from a Spring.

Theſe Plants are common on many of the *Bahama* Iſlands, and uſually grow on large Trees, particularly to *Mahogony*, *Sappadillo*, *Mancanel*, *&c.* which are ſometimes ſo covered with them, that they ſeem to be the Leaves and Bloſſoms of the Tree on which they grow, and make a very elegant Appearance.

Anana Sauvage.

*CETTE Plante ſort d'une racine ronde & tubereuſe avec quantité de fibres qui ſe repandent ſur la ſurface des branches & des autres parties des arbres, où elles s'inſinuent un peu dans l'écorce: Il vient de la racine pluſieurs feuilles concaves pliées en quelque façon comme celles de l'*Ananas; *ils ſont prominents en dehors & large; embas elles vont toujours en diminuant, & ſe terminent enfin en des pointes étroites & herbeuſes retournées en arriere & pendantes. Il ſort du milieu une tige ronde & droite, au haut de laquelle il ſe trouve cinq pointes rouges & écaillées plus ou moins de cinq ou ſix pouces de long, des côtez deſquels ſort obliquement pluſieurs fleurs bleues cylindriques, tubuleuſes & monopetales avec pluſieurs étamines; & un ſtile jaune: la fleur n'eſt compoſée que d'une ſeule feuille, & pliée en ſpirale d'une maniere particulière. Ces Plantes ne ſont pas toutes de la même hauteur, elles ont depuis un pied juſques à deux, & ſont toujours toutes droites. L'uſage le plus excellent de cette plante utile & admirable vient de ce que ſes feuilles étant creuſes ployées l'une dans l'autre ſont en ſi grand nombre, qu'une ſeule plante contient deux quartes d'eau claire. Dans pluſieurs païs entre les Tropiques, où l'eau manque, n'ayant ni fontaines ni rivieres, on trouve grand nombre de ces Plantes, qui ſont d'un grand ſecours aux gens alterez, comme j'ai experimenté ſouvent moi-même en beuvant des bons coups de cette eau rafraichiſſante; car quoique le ſoleil y darde ſes rayons perpendiculairement, elle eſt toujours auſſi fraiche que celle d'une fontaine. Ces Plantes ſont aſſez communes dans pluſieurs des Iſles* Bahama, *& viennent ordinairement ſur les grands arbres, & particulierement ſur le* Mahogony, *le* Sappadillo, *le* Mancanel, *&c. qui en ſont quelquefois ſi couverts, qu'il ſemble que ce ſoient les feuilles & les fleurs de l'arbre même ſur lequel elles croiſſent, ce qui fait une veue fort agreable.*

LOCUSTA Caroliniana, *elytris fuſcis; alis interioribus nigris, ad extremitates luteis.*

Sauterelle.

THE whole Body with the Legs and the two fore Wings of this Graſhopper is of a brown Colour; the two broad Wings which are placed behind, are black, and bordered with yellow towards their Extremities. Theſe Graſhoppers are found in *Carolina*.

TOUT le corps, les jambes & les deux aîles de devant de cette Sauterelle eſt de couleur brune: Les deux grandes aîles de derriere ſont noires & bordées de jaune vers leurs extrémitez. On trouve de ces Sauterelles dans la Caroline.

MARK CATESBY *The Natural History of Carolina, Florida and the Bahama Islands* LONDON, 1731–1747 CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES Octavo